

CIDENTAL®

Larvicida y Repelente

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Cidental® está indicado en bovinos para el tratamiento de lesiones, inclusive del ombligo de los terneros recién nacidos. Como larvicida y repelente de moscas en general: *Musca doméstica* y *Cochliomyia hominivorax*. En la cura y prevención de miasis (gusaneras) causadas por *Cochliomyia hominivorax*.

Cidental® es muy eficaz para el tratamiento profiláctico de las heridas quirúrgicas, castración y descoronado principalmente. Está indicado para el tratamiento de las miasis en heridas. Esta indicado para el tratamiento de las heridas así mismo como repelente de moscas en las orejas de los animales.

Cidental® puede utilizarse de manera preventiva en cualquier herida para miasis causada por larvas de mosca *Cochliomyia hominivorax*.

BENEFICIOS

- **Efecto desalojante único:** Las larvas salen de la herida y mueren.
- Acción larvicida.
- **Repelente de moscas:** Previene nuevas miasis.
- Las larvas y heridas libres de moscas sanan más rápido.
- No lesiona el ombligo ni las heridas.
- No hace ruido, por lo que no asusta al animal.
- Práctico y fácil de aplicar.
- El color violeta permite identificar los animales tratados.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis



Larvicida y Repelente

INTRODUCCIÓN:

CIDENTAL® actúa como desalojante de las larvas, larvicida, repelente y cicatrizante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CIDENTAL®, matabichera a base de:

- **Propoxur:** carbamato que actúa como un inhibidor de la colinesterasa que lleva a las larvas a la hiperactividad (lo que facilita su salida de la herida), seguida de ataxia, convulsiones, parálisis y muerte. Es por esto que **CIDENTAL®** actúa rápidamente y tiene un gran efecto de derribo (hace que la larva caiga rápidamente).
- **Cihalotrina:** piretroide que actúa sobre los canales de sodio de las células del sistema nervioso de los insectos (incluidas las larvas), causando la despolarización de la membrana de las células nerviosas. También actúa sobre los receptores de GABA y glutamato. El resultado final de su acción es la hiperactividad, seguida de la incoordinación de los movimientos, temblores, convulsiones, caídas y muerte del ectoparásito. La cihalotrina permite que **CIDENTAL®** tenga una larga acción y un efecto duradero.
- El propoxur y cihalotrina tienen acción complementaria, haciendo que las larvas salgan rápidamente de la herida y mueran, además de actuar durante más tiempo en el sitio de aplicación.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

| | |
|------------------|-----------|
| Cihalotrina..... | 1,00 g |
| Propoxur..... | 1,00 g |
| Excipientes..... | 100,00 mL |

INDICACIONES:

- **CIDENTAL®** está indicado en bovinos para el tratamiento de Lesiones, inclusive del ombligo de los terneros recién nacidos. Como larvicida y repelente de moscas en general: *Musca doméstica* y *Cochliomyia hominivorax*. En la cura y prevención de miasis (bicheras) causadas por *Cochliomyia hominivorax*.
- **CIDENTAL®** es eficaz para el tratamiento profiláctico de las heridas quirúrgicas, castración y descornado principalmente.
- Está indicado para el tratamiento de gusaneras.
- Esta indicado para el tratamiento de las heridas así mismo como repelente de moscas en las orejas de los animales.
- **CIDENTAL®** puede utilizarse de manera preventiva en cualquier herida para miasis causada por larvas de mosca *Cochliomyia hominivorax*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- **CIDENTAL®** está indicado exclusivamente para uso tópico. Aplicar abundantemente el producto en el lugar de la herida o en la "bichera" y a su alrededor. Normalmente una aplicación es suficiente. Si es necesario, repetir con intervalo de 24 horas.
- En el caso de bicheras cuya abertura está orientada hacia abajo, aplicar el producto y mantener al animal acostado durante al menos 3 minutos para que el producto alcance las capas inferiores.

PRECAUCIONES:

- **CIDENTAL®** como todo insecticida, debe ser manipulado cuidadosamente.
- No almacenar el producto con alimentos, medicamentos, bebidas y productos de higiene personal o del hogar.
- No almacenar en casas de habitación.
- Lavarse bien las manos y las partes expuestas del cuerpo antes de comer o beber y después de trabajar con el producto.
- Utilizar equipo de protección individual (guantes, máscara, lentes de protección, gorro y máscara contra gases tóxicos) en el momento de la aplicación del producto.
- No reutilizar los envases vacíos.
- Destruya el envase después del uso del producto.
- No contaminar ríos y otros tipos de agua.
- En caso de contacto accidental en humanos buscar atención médica inmediatamente.
- El antídoto en caso de intoxicación, incluye Sulfato de Atropina (Propoxur) y tratamiento sintomático (Cihalotrina).

No apto para uso en humanos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte a su Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura menor de 30°C.

Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frascos de 250 mL.

TIEMPO DE RETIRO:

- No sacrificar a los animales para consumo humano antes de 6 días después de la aplicación del producto.
- No destinar a consumo humano la leche de animales tratados transcurrido antes de los 6 días después de la aplicación del producto.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, No. 421, Monte Mor / SP - CNPJ
00.328.741/0001-04

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10
Zona Pradera Torre II, Nivel 15
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt