

DORACIDE

Doramectina 1%

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Doracide está indicado para el tratamiento, prevención y control de parásitos internos y externos de los bovinos:

- **Parásitos gastrointestinales:** en las formas adultos de *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia pectinova*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia punctata* y *Trichuris discolor*.
- **Larva:** Larvas de *Dermatobia hominis*.
- **Garrapata:** *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.
- **Miasis:** Prevención de las "gusaneras" causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

BENEFICIOS

- Endectocida de amplio espectro.
- Alta eficacia.
- Doracide puede ser administrado con seguridad en bovinos jóvenes y adultos, inclusive terneros y hembras preñadas.
- Ayuda en la prevención de infestaciones de gusano barrenador como parte de un programa de control integrado



Ver el reverso para información completa de administración y dosis



INTRODUCCIÓN:

Doracide es un endectocida a base de Doramectina al 1% para uso en bovinos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Doramectina es una lactona macrocíclica obtenida por biosíntesis de una mutación, en la cual el precursor (ácido ciclohexano carboxílico) fue adicionado a una cepa mutante de *Streptomyces avermitilis* obteniéndose una avermectina que difiere de ivermectina en su estructura química, por la presencia de un núcleo ciclohexilo a nivel de C25. La Doramectina tiene actividad contra endoparásitos y ectoparásitos, específicamente nematodos y artrópodos. Además de tener actividad de amplio espectro, es efectiva a muy bajas concentraciones y generalmente presenta baja toxicidad en mamíferos.

Es un fármaco muy liposoluble, lo que se relaciona con una extensa distribución por los diferentes tejidos del organismo. Alcanza elevadas concentraciones en tejidos de localización parasitaria, como las mucosas abomasal e intestinal, la piel y el tejido pulmonar.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de Doracide contienen:

Doramectina 1.0 g
Excipientes c.s.p 100.00 mL

INDICACIONES:

Bovinos: 1 ml por cada 50kg de peso corporal. Inyecte subcutáneo o intramuscular, utilizar precauciones asépticas.

Ovinos: 0.5ml por cada 25kg de peso corporal. Inyecte subcutáneo o intramuscular, utilizar precauciones asépticas.

UNIMECTINE 3.15% ACCIÓN PROLONGADA puede ser administrado a vacas y ovejas a cualquier etapa de preñez o lactancia, excepto cuando la leche está previsto para consumo humano.

UNIMECTINE 3.15% ACCIÓN PROLONGADA puede ser dado en todas las edades de animales, terneros y corderos jóvenes.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Doracide está indicado para el tratamiento, prevención y control de parásitos internos y externos de los bovinos:

- **Paracitos gastrointestinales:** en las formas adultos de *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia pectinova*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia punctata* y *Trichuris discolor*.
- **Larva:** *Larvas de Demantchia hominis*.
- **Garrapata:** *Rhipicephalus(Boophilus) microplus*.
- **Miasis:** Prevención de las "gusaneras" causadas por larvas de *Cochliomyia hominivora*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Doracide debe ser administrado por vía subcutánea en las dosis recomendadas de preferencia atrás de la paleta.

Bovinos: aplicar la dosis de 1 mL por cada 50 kg de peso, lo que equivale a 200 µg de Doramectina por kg de peso vivo.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 31 días después de finalizado el tratamiento.

Este producto no debe aplicarse a hembras productoras de leche para el consumo humano.

CONTRAINDICACIONES:

- No aplicar el producto en vacas productoras de leche para el consumo humano.
- No aplicar en animales con hipersensibilidad conocida a los principios activos del producto.
- No aplicar en animales enfermos, débiles, estresados o cansados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Mantener el empaque cerrado y protegido de la luz directa y calor. Obedecer las dosificaciones y recomendaciones para uso del producto.

Aplicar el producto únicamente por vía subcutánea.

No coma, no beba y no fume durante la manipulación del producto. No contamine depósitos de agua de cualquier naturaleza.

- No apto para uso en humanos.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta. Consulte a su Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C.

Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

Frascos de 50 mL, 250 mL y 500 mL.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

www.bimeda.gt

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

Bimed Brasil S.A. Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421

Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

www.bimeda.com.br

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10

Zona Pradera Torre II, Nivel 15

Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt