

Levamin® fos

LEVAMISOL FOSFATO

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Levamin® Fos es un producto bastante eficaz contra parásitos pulmonares: Dictyocaulus viviparus, parásitos gastrointestinales: Haemonchus contortus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Oesoph agostomum, Neoascaris, Ascaris suum, Metastrongylus y Hyostrongylus que parasitan bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.



BENEFICIOS

- Efecto inmunoestimulante en animales inmunosuprimidos.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

Levamin® Fos

Levamisol Fosfato

Antihelmíntico

SOLUCIÓN INYECTABLE



FÓRMULA:

Cada 100mL contienen:

Fosfato de levamisol 22.3g

Excipientes c.s.p.

INDICACIONES

Es un producto bastante eficaz contra parásitos pulmonares: Dictyocaulus viviparus, parásitos gastrointestinales: Haemonchus contortus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Neoascaris, Ascaris suum, Metastrongylus y Hyostrongylus que parasitan bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- Bovinos:** 4.46-7.5mg por kg de peso equivalente a 1mL por 50kg de peso y 1mL por 30kg de peso para parásitos pulmonares, vía intramuscular o subcutánea. Dosis única.
- Ovinos, Caprinos y Porcinos:** 8mg por kg de peso equivalente a 1mL por 27 kg de peso, vía intramuscular o subcutánea. Dosis única.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:

- No aplicar más de 20mL por sitio de inyección.
- No utilizar en animales debilitados y otros que presenten daños severos en el hígado y riñones.
- Preferiblemente no se utilice cuando se castra, descorne y vacuna. En animales gestantes de preferencia no se utilice al inicio. Después si puede aplicarse. Sin embargo puede haber golpes entre los mismos animales del rebaño que puedan provocar inconvenientes y luego ser atribuidos al levamisol.

ADVERTENCIAS:

No utilizar este producto 8 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. La leche de los animales tratados debe desecharse por tres días, después de la última aplicación. No se utilice en equinos.

REACCIONES ADVERSAS:

- En todas las especies provoca debilitación severa, por lo que se recomienda que antes del tratamiento todos deben de permanecer dos o tres horas en reposo antes de la administración del medicamento.

- Además pueden presentarse síntomas como salivación, incoordinación y temblores musculares, excitación, vómitos, convulsiones, estos síntomas son transitorios desapareciendo en un plazo de 20 a 30 minutos.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y ADMINISTRAR BAJO SUPERVISIÓN MÉDICO VETERINARIO.

Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar directa, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Lea el inserto antes de utilizar el producto.

PRESENTACIÓN:

- Frascos de 100 mL, 250 mL y 500 mL.

PERÍODO DE VALIDEZ:

2 años a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto el frasco, utilizar en un plazo máximo de 60 días.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421
Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ
00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10
Zona Pradera Torre II, Nivel 15
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt