

# UNIFUNGUIN® 200 mg

Ketoconazol 200 mg

Antimicótico de amplio espectro

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

**Unifunguin® 200 mg** está indicado en el tratamiento de enfermedades e infecciones de la piel causadas por hongos, dermatófitos y/o levaduras que no responden a la terapia local. Entre estos se pueden encontrar casos de dermatofitosis, onicomiosis, candidiasis, paracoccidioomicosis, histoplasmosis, coccidioomicosis y blastomicosis.

### BENEFICIOS

- Antimicótico de amplio espectro, eficaz contra hongos y levaduras.
- Alta eficacia contra la micosis sistémicas.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

# Unifunguin® 200 mg

Tabletas

Ketoconazol 200 mg

Antimicótico de amplio espectro



## FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ketoconazol ..... 200,00mg

Excipientes c.s.p. .... 1 tableta

## INDICACIONES:

Unifunguin® 200 mg está indicado en el tratamiento de enfermedades e infecciones de la piel causadas por hongos, dermatófitos y/o levaduras que no responden a la terapia local. Entre estos se pueden encontrar casos de dermatofitosis, onicomicosis, candidiasis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y blastomicosis.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, antes de cada comida:

**Dosis en Caninos y Felinos:** de 5 a 20 mg/ kg de peso corporal. De 1 a 8 semanas en dermatofitosis. En otras micosis sistémicas se podrá ampliar a 3 meses de tratamiento. Consulte al médico veterinario.

## CONTRAINDICACIONES:

- El ketoconazol está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática o trombocitopenia.
- No administrar en animales en periodo de gestación.

## EFECTOS ADVERSOS:

- Los efectos adversos más comunes son la anorexia, vomito y diarrea.
- Se informa que puede producir hepatotoxicosis e incremento en las enzimas hepáticas.
- Ocasionalmente induce cambios en el tono de pelo.
- Tiene un efecto supresor temporal de la función gonadal y de la síntesis de esteroides adrenales; p. ej. Se ha observado que dosis menores de 10mg/kg disminuyen la testosterona sérica 3-4h después de haber administrado ketoconazol, y con 30 mg/kg/día hay supresión sérica de cortisol. En estos casos pueden administrarse adicionalmente corticosteroides.

## PRECAUCIONES:

- Almacenar a temperatura no mayor de 30°C, protegido de la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- En casos de sobredosis se recomienda hacer un lavado gástrico con bicarbonato de sodio.

## PERÍODO DE VALIDEZ:

- 2 (dos) años después de la fecha de fabricación.

## PRESENTACIÓN:

- Caja conteniendo 10 tabletas

## PROPIETARIO Y FABRICANTE:

**MANUFACTURADO POR: Biofarm Química y Farmacéutica LTDA**

**PARA: PROPIETARIO: BIMEDA BRASIL S.A.**

Rod. Conego Cyriaco S. Pires, nº421 Monte Mor /SP –

CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

## INDUSTRIA BRASILEÑA

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Bimeda (G), S.A**

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10

Zona Pradera Torre II, Nivel 15

Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)