

Uniciclina® 100 mg

Oxitetraciclina 100 mg

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Uniciclina 100 mg Altamente efectivo contra estreptococos, pasteurella, brucella, salmonella, leptospira, entre otros y protozoarios como anaplasma. Para tratamiento de cualquier infección sistémica y local.

BENEFICIOS


- Antibiotico de amplio espectro, eficaz contra la mayoría de bacterias gram positivas y gram negativas



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

Uniciclina® 100 mg

Oxitetraciclina
USO VETERINARIO
SOLUCIÓN INYECTABLE



FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Oxitetraciclina clorhidrato eq. a
Oxitetraciclina base 100 mg
Excipientes c.s.p.

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones provocadas por microorganismos grampositivos, gramnegativos y rickettsias. Está indicado en: Pasteurelosis, neumonías (incluyendo la enzootica), leptospirosis, artritis infecciosa, necrobacilosis, actinobacilosis, mastitis, metritis, edema maligno, ántrax, erisipela, listeriosis y para mastitis-metritis-agalactia.

DOSIS:

- Generalmente se aplica 1 ml por cada 10 kg de peso vivo, el tratamiento deberá sostenerse por tres días, durante los cuales se debe de observar mejoría.
- Usualmente es administrada en dosis de 250-500 mg durante 4 veces diariamente por mes, una hora antes de comer o 2 horas después de comer.
- En aves aplicar ¼ a ½ ml dependiendo de la gravedad de la enfermedad.
- En gatos y perros puede usarse 7 mg/kg por vía IM o IV cada 12 horas; o por vía oral 20 mg/kg cada 8 horas.
- En vacas, ovejas y cerdos se utilizan 5 - 10 mg/kg por vía IM o IV cada 24 horas.
- En terneros, potrillos, cordero y lechones se utilizan de 10 - 20 mg/kg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, según el criterio del médico veterinario.

PRECAUCIÓN:

Cuando utilice la vía IV, administrar lentamente..

TIEMPO DE RETIRO EN CARNE:

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano 30 días después de finalizado el tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO EN LECHE:

- La leche producida durante el tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

PRODUCTO VETERINARIO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y EL CALOR, CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

- No mayor de 30°C.

ESPECIES:

- Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Aves, Caninos y Felinos

PRESENTACIÓN:

- Frascos de 10 mL, 50 mL, 100 mL y 250 mL

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, No. 421, Monte Mor / SP - CNPJ 00.328.741/0001-04

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10
Zona Pradera Torre II, Nivel 15
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt