

UNICIL® 1.2

Polvo estéril + solvente de Piroxicam

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

UNICIL® 1.2 esta indicado por la acción larga, media y corta de las penicilinas, en el tratamiento o prevención de infecciones locales y sistémicas causadas por bacterias susceptibles gram-negativos y grampositivos como: sepsis, tráqueobronquitis, neumonía, osteoartritis e infecciones del tracto urinario, de la piel y heridas.

BENEFICIOS

- Alta eficacia con una sola dosis.
- Por su combinación con piroxicam, posee acción antiinflamatoria y antipirética en una sola inyección.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

Unicil®1.2

Polvo estéril + solvente de Piroxicam

Uso veterinario

Liofilizado para suspensión inyectable

Penicilina G Benzatínica + Penicilina G Procaínica +

Penicilina G Sódica + Sulfato de Estreptomicina + Solvente de piroxicam



FÓRMULA:

Cada frasco de polvo estéril contiene:

Penicilina G benzatínica	600,000 UI
Penicilina G procaína	300,000 UI
Penicilina G sódica	300,000 UI
Estreptomicina sulfato eq. a estreptomicina	0.5 g
Excipientes c.s.p.....	1 frasco

FÓRMULA SOLVENTE:

Cada 1 mL de solvente contiene:

Piroxicam	20 mg
Excipientes c.s.p.....	1 mL

INDICACIONES:

Unicil® 1.2 esta indicado por la acción larga, media y corta de las penicilinas, en el tratamiento o prevención de infecciones locales y sistémicas causadas por bacterias susceptibles gram-negativos y grampositivos como: sepsis, traqueobronquitis, neumonía, osteoartritis e infecciones del tracto urinario, de la piel y heridas.

INSTRUCCIONES DE RECONSTITUCIÓN:

La suspensión debe prepararse en el momento de usarla, mezclando el Unicil® 1.2 polvo con el solvente, agitando hasta obtener una suspensión completamente homogénea. Después de mezclada con el solvente, se debe utilizar inmediatamente. La suspensión restante que no fue utilizada debe descartarse.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

Perros y Gatos: 10,000 a 20,000 UI por Kg de peso equivalente a 0.5 a 1. mL/20kg de peso. La dosis debe repetirse de 48-72 horas según criterio del Médico Veterinario y Zootecnista.

EFFECTOS ADVERSOS:

- En raras ocasiones pueden ocurrir en los animales reacciones de sensibilidad a la penicilina y/o estreptomicina. Si se presentan tales reacciones, debe de administrarse inmediatamente el tratamiento apropiado por ejemplo, antihistamínicos, o ambos.
- El piroxicam es generalmente bien tolerado. Los efectos colaterales más comúnmente encontrados son los síntomas gastrointestinales, pero en muchas circunstancias no interfieren en el curso del tratamiento. Estas reacciones adversas incluyen estomatitis, anorexia, malestar epigástrico, náuseas, constipación, molestias abdominales, flatulencia, diarrea, dolor abdominal e indigestión. Evaluaciones objetivas del estado de la mucosa gástrica y de la pérdida sanguínea intestinal, muestran que 20 mg/día de piroxicam administrados ya sea en una sola dosis o dividida, es significativamente menos irritante para el tracto gastrointestinal que el ácido acetilsalicílico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Evitar el uso prolongado de antibióticos debido a que promueve el crecimiento de organismos no susceptibles, adquiriéndose resistencia bacteriana a penicilinas y a la estreptomicina.
- Se recomienda no aplicar en el mismo lugar dosis superiores a 20 mL.
- Estudios en animales no han demostrado ningún efecto de teratogénico.
- La droga es excretada en la leche en muy bajas concentraciones (aproximadamente 1% en el plasma materno).

CONTRAINDICACIONES :

- No aplicar a hembras gestantes en el último tercio de la gestación, debido a que puede inducir el parto.
- En animales con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- El piroxicam está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga, en pacientes a los cuales la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides inducen los síntomas de asma, rinitis, angioedema o urticaria.
- El uso concomitante de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides potencializan la existencia de sensibilidad.

PERÍODO DE VALIDEZ:

03 (tres) años después de la fecha de fabricación.

- Unicil® 1.2 debe almacenarse y manipularse con cuidado.
- Mantener el producto en su embalaje original, bien cerrado, fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- No almacene el producto junto a alimentos, medicamentos, bebidas, productos de higiene y cosméticos.
- No reutilice los envases vacíos del producto.
- Durante la aplicación, use guantes impermeables como protección.
- No tirar sobrantes ni envases vacíos en ríos, lagos, manantiales, etc.
- Almacenar a temperatura menor de 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y ADMINISTRAR BAJO SUPERVISIÓN MÉDICO VETERINARIO.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

FABRICANTE: Biofarm Química y Farmacéutica LTDA

PARA: PROPIETARIO: BIMEDA BRASIL, S.A.

Rod. Conego Cyriaco S. Pires, nº421

Monte Mor /SP – CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04 SAC 0800 555408

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimed (G), S.A

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10

Zona Pradera Torre II, Nivel 15

Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt