

# UNICIL® 6

Polvo estéril + solvente de Piroxicam

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

UNICIL® 6 está indicado en el tratamiento o prevención de infecciones locales y sistémicas causadas por bacterias gram-negativas y gram-positivas susceptibles. Traqueobronquitis, neumonía, infecciones urinarias, de piel y heridas, entre otras.

### BENEFICIOS

- Alta eficacia con una sola dosis.
- Por su combinación con piroxicam, posee acción antiinflamatoria y antipirética en una sola inyección.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis



**Polvo estéril + solvente de Piroxicam**

**Uso veterinario**

**Liofilizado para suspensión inyectable antibiótico**



#### FÓRMULA:

Cada frasco ampolla contiene:

|  |              |
|--|--------------|
| Penicilina G benzatínica eq.a penicilina G ..... | 3,000,000 UI |
| Penicilina G procaína eq.a penicilina G .....    | 1,500,000 UI |
| Penicilina G sódica eq.a penicilina G .....      | 1,500,000 UI |
| Estreptomicina sulfato eq.a streptomicina .....  | 1,25 g       |

#### FÓRMULA DE SOLVENTE:

Cada mL de solvente contiene:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Piroxicam .....         | 20 mg |
| Excipientes c.s.p. .... | 1 mL  |

#### INDICACIONES:

**UNICIL® 6** esta indicado en el tratamiento o prevención de infecciones locales y sistémicas causadas por bacterias gram-negativas y gram-positivas susceptibles. Traqueobronquitis, neumonía, infecciones urinarias, de piel y heridas, entre otras.

#### INSTRUCCIONES DE RECONSTITUCIÓN:

La suspensión debe prepararse en el momento de usarla, mezclando el **Unicil® 6** polvo con el solvente agitando hasta obtener una suspensión completamente homogénea. Despues de mezclada con el solvente, se debe utilizar inmediatamente. La suspensión que no fue utilizada debe descartarse

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

**Bovinos, Caprinos, Ovinos, Porcinos:** 10,000 a 20,000 UI por Kg de peso equivalente a 0.50 a 1.00mL/20kg de peso. La dosis debe repetirse de 48-72 horas según criterio del Médico Veterinario y Zootecnista.

#### TIEMPO DE RETIRO:

**NO UTILIZAR ESTE PRODUCTO 30 DÍAS ANTES DEL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES DESTINADOS PARA CONSUMO HUMANO. NO UTILIZAR PARA CONSUMO HUMANO LA LECHE PROCEDENTE DE ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO HASTA 3 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN.**

#### EFEKTOS ADVERSOS:

- En raras ocasiones pueden ocurrir en los animales reacciones de sensibilidad a la penicilina y/o streptomicina. Si se presentan tales reacciones, iniciar inmediatamente tratamiento apropiado por ejemplo, antihistamínicos.
- El piroxicam es generalmente bien tolerado. Los efectos colaterales más comúnmente encontrados son estomatitis, anorexia, malestar epigástrico, náuseas, constipación, molestias abdominales, flatulencia, diarrea, dolor abdominal e indigestión

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Evitar el uso prolongado de antibióticos debido a que promueve el crecimiento de organismos no susceptibles, facilitando la aparición de resistencia bacteriana a penicilinas y a la streptomicina.
- Se recomienda no aplicar en el mismo lugar dosis superiores a 20 mL.
- Estudios en animales no han demostrado ningún efecto de teratogénico.
- La droga es excretada en la leche en muy bajas concentraciones (aproximadamente 1% en el plasma materno).

#### CONTRAINDICACIONES :

- No aplicar a hembras gestantes en el último tercio de la gestación, debido a que puede inducir el parto.
- En animales con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- El piroxicam está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga en pacientes los cuales la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides inducen los síntomas de asma, rinitis, angioedema o urticaria.
- El uso concomitante de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides potencializan la existencia de sensibilidad.

#### PERÍODO DE VALIDEZ:

03 (tres) años después de la fecha de fabricación.

- Almacenar a temperatura menor de 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

#### VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y ADMINISTRAR BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA VETERINARIO.

#### PROPIETARIO Y FABRICANTE:

**MANUFACTURADO POR:** Biofarm Química y Farmacéutica LTDA

**PARA: PROPIETARIO:** BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Conego Cyriaco S. Pires, nº421 Monte Mor /SP –  
CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04  
SAC 0800 555408

#### INDUSTRIA BRASILEÑA

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Bimeda (G), S.A**  
Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10  
Zona Pradera Torre II, Nivel 15  
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)